



Canada's source for
HIV and hepatitis C
information

La source canadienne
de renseignements sur
le VIH et l'hépatite C

Ce que vous devez savoir sur la gonorrhée

La gonorrhée est une infection transmissible sexuellement (ITS) qui se transmet le plus facilement lors des relations sexuelles sans condom. Elle peut infecter les organes génitaux, le rectum, la bouche et la gorge. On peut guérir l'infection avec des antibiotiques, et il existe des façons de réduire le risque de contracter ou de transmettre la gonorrhée, telles que l'utilisation d'un condom lors de chacune de vos relations sexuelles.

À propos de nos mots – CATIE s'engage à utiliser un langage qui est pertinent pour tout le monde. Les gens emploient des termes différents pour décrire leur corps. Ce texte utilise des termes médicaux comme pénis et vagin pour décrire les organes génitaux. D'autres personnes préfèrent d'autres termes, tels que parties intimes, queue ou trou frontal. CATIE reconnaît et accepte que les gens utilisent les mots avec lesquels ils sont le plus à l'aise.

Qu'est-ce que la gonorrhée?

La gonorrhée est une infection transmissible sexuellement (ITS). Elle peut infecter les organes génitaux, le rectum et la gorge. Une personne atteinte de gonorrhée peut la transmettre à une autre personne lors d'une relation sexuelle.

Comme de nombreuses personnes atteintes de gonorrhée n'éprouvent aucun symptôme, elles ignorent qu'elles ont une infection. Lorsque des symptômes se produisent, ils peuvent mettre de 2 à 7 jours à se manifester. Les symptômes courants varient selon la partie du corps infectée :

- Les infections des organes génitaux peuvent causer des écoulements (un liquide inhabituel sort du vagin ou du pénis), de la douleur à la miction (uriner), des saignements vaginaux, des saignements entre les règles, de la douleur lors des relations sexuelles vaginales, de l'enflure ou de la douleur dans les testicules ou de la douleur abdominale.
- Les infections rectales peuvent causer des démangeaisons anales, un écoulement anal, des selles douloureuses ou la sensation d'avoir besoin d'aller à la selle.
- Les infections de la gorge ou de la bouche peuvent causer un mal de gorge.

Si elle n'est pas traitée, la gonorrhée peut causer l'infertilité, de la douleur abdominale ou des complications lors de la grossesse.

Est-ce que je peux contracter la gonorrhée?

Toute personne sexuellement active peut contracter la gonorrhée, y compris les victimes de violence sexuelle.

La gonorrhée se transmet le plus facilement lors des relations sexuelles sans condom; cela inclut les relations vaginales et anales.

Bien que cela arrive moins fréquemment, la gonorrhée peut également se transmettre :

- lorsqu'une personne ayant la gonorrhée dans la bouche ou la gorge donne du sexe oral à une autre personne
- lorsqu'une personne donne du sexe oral à une autre personne ayant la gonorrhée sur ou dans ses organes génitaux
- par les contacts bucco-anaux (anulingus ou *rimming*)
- lorsqu'on partage des jouets sexuels, que l'on masturbe une autre personne ou qu'on lui passe un doigt si des liquides infectés sont présents sur le jouet ou la main

La gonorrhée et le VIH

Pour une personne atteinte du VIH, une infection à la gonorrhée peut accroître la quantité de VIH dans ses liquides corporels et augmenter le risque de transmettre le VIH à ses partenaires sexuels.

Une personne ayant la gonorrhée peut être plus à risque de contracter le VIH si elle est exposée à ce dernier lors d'une relation sexuelle.

Que puis-je faire?

Prévenir l'infection

Utilisez un condom lors de vos relations sexuelles vaginales et anales.

Utilisez un condom ou une digue dentaire lors de vos relations sexuelles orales.

Il n'existe aucun vaccin qui protège contre la gonorrhée.

Se faire tester

La seule façon de savoir avec certitude si vous avez la gonorrhée consiste à vous faire tester. Un médecin ou une infirmière peut faire le test pour vous. Le test consiste en un frottis des organes génitaux, du rectum ou de la gorge ou encore en une analyse d'urine. Décrivez au médecin ou à l'infirmière toutes les différentes sortes de relations sexuelles que vous avez eues afin qu'ils puissent tester toutes les parties pertinentes de votre corps.

Lorsque vous vous faites tester pour la gonorrhée, c'est une bonne idée de vous faire tester aussi pour d'autres infections transmissibles sexuellement (ITS), comme le VIH. D'autres ITS peuvent être transmises de la même façon que la gonorrhée. Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir à quelle fréquence vous devriez passer des tests de dépistage de la gonorrhée et d'autres ITS.

Si vous recevez un diagnostic de gonorrhée, un intervenant de la santé publique vous parlera de la nécessité d'aviser vos partenaires sexuels qui auraient pu être exposés à la gonorrhée et de les encourager à se faire tester. Votre identité ne sera pas révélée.

Se faire traiter

On peut guérir la gonorrhée avec une seule dose d'antibiotiques oraux ou injectables, mais le traitement peut varier selon la région que vous habitez. Une fois que vous aurez pris le traitement, on effectuera peut-être un autre test afin de s'assurer que vous n'avez plus la gonorrhée. Vous devriez attendre 7 jours après le traitement avant d'avoir de nouveau des relations sexuelles.

Une fois que vous serez guéri, vous ne pourrez pas transmettre la gonorrhée à vos partenaires sexuels. Vous pourriez toutefois être infecté de nouveau. Le fait de suivre un traitement contre la gonorrhée ne vous protège pas contre cette infection à l'avenir.

Crédits

Ce feuillet d'information a été créé en partenariat avec le Sex Information and Education Council of Canada (SIECCAN).

Ressource

[La gonorrhée](#) - Feuillet d'information de CATIE

Produit par:



La source canadienne
de renseignements sur
le VIH et l'hépatite C

555, rue Richmond Ouest, Bureau 505, boîte 1104
Toronto (Ontario) M5V 3B1 Canada
téléphone : 416.203.7122
sans frais : 1.800.263.1638
télécopieur : 416.203.8284
site Web : www.catie.ca
numéro d'organisme de bienfaisance : 13225 8740 RR

Déni de responsabilité

Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à l'hépatite C et des traitements en question.

CATIE fournit des ressources d'information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l'hépatite C qui, en collaboration avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou diffusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l'accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons ni n'appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e) avant de prendre toute décision d'ordre médical ou d'utiliser un traitement, quel qu'il soit.

CATIE s'efforce d'offrir l'information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant, l'information change et nous encourageons les utilisateurs à s'assurer qu'ils ont l'information la plus récente. Toute personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n'assument aucune responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l'usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE ou auquel CATIE permet l'accès ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.

L'information sur l'usage plus sécuritaire de drogues est offerte comme service de santé publique pour aider les personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l'hépatite virale et de toute autre infection. Cette information n'a pas pour but d'encourager ni de promouvoir l'utilisation ou la possession de drogues illégales.

La permission de reproduire

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des fins non commerciales sans permission, mais toute modification de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit apparaître sur toute réimpression de ce document : *Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau canadien d'info-traitements sida). Pour plus d'information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au 1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.*

© CATIE

La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada.

Disponible en ligne à

<http://www.catie.ca/fr/feuilles-info/its/gonorrhée/messages-cles-gonorrhée>