



Canada's source for  
HIV and hepatitis C  
information

La source canadienne  
de renseignements sur  
le VIH et l'hépatite C

## Nouvelles-CATIE

Des bulletins de nouvelles concis en matière de VIH et d'hépatite C de CATIE.

### Taux élevé d'acceptation du dépistage rapide de l'hépatite C

16 juin 2016

Les personnes qui passent des tests diagnostiques, y compris les tests de dépistage d'infections virales, font parfois face à de longues attentes pour en recevoir les résultats. Si, de surcroît, il est nécessaire qu'elles retournent à la clinique ou au site de dépistage, certaines personnes ne s'y rendent jamais et n'obtiennent jamais leurs résultats.

Face à cette situation, les technologies de dépistage des infections qui donnent un résultat rapide qu'un intervenant formé peut communiquer sans tarder au patient sont une option attrayante. Non seulement les tests de ce genre réduisent les délais d'attente, mais ils permettent aussi aux patients recevant un résultat positif de recevoir un counseling et de se faire diriger rapidement vers le système de santé pour recevoir une évaluation, des soins et l'offre d'un traitement.

Lorsque des tests sont effectués à l'extérieur d'un laboratoire, comme dans un cabinet de médecin ou un centre de santé communautaire, on parle de tests de dépistage aux points de service. La compagnie OraSure Technologies (Bethlehem, Pennsylvanie) a mis au point un test de dépistage rapide par fluide oral des anticorps anti-hépatite C (VHC) qu'elle a baptisé OraQuick. Ce test donne un résultat dans 20 minutes et a été approuvé aux États-Unis en 2010. Santé Canada évalue actuellement les données se rapportant à ce test afin de déterminer s'il va l'homologuer.

Des chercheurs du Wisconsin ont réalisé un sondage auprès de plusieurs centaines de personnes qui fréquentaient des programmes de seringues et d'aiguilles urbains et ruraux de cet état afin de connaître leurs attitudes à l'égard du dépistage rapide du VHC. Parmi 413 participants qui n'avaient jamais eu d'infection au VHC et qui ont répondu au sondage, 85 % disaient qu'ils seraient prêts à passer un test de dépistage rapide du VHC si la possibilité leur était présentée. Les résultats de cette étude menée au Wisconsin révèlent donc un taux élevé d'acceptation du dépistage rapide du VHC. Si une technologie de dépistage rapide du VHC est approuvée au Canada, il sera important de réaliser un sondage semblable auprès des populations principales qui profiteraient de l'accessibilité et de l'usage d'un tel test.

#### Résultats

Les chercheurs ont créé un questionnaire que les participants remplissaient à l'aide d'une tablette électronique. L'analyse des résultats a révélé que les participants de moins de 30 ans qui croyaient courir un risque élevé de contracter le VHC étaient plus susceptibles de vouloir utiliser le dépistage rapide.

#### Dépistage intégré

Selon les chercheurs du Wisconsin, le dépistage rapide du VHC pourrait être « un outil utile » pour aider les personnes courant un risque élevé de contracter le VHC à connaître leur statut par rapport à l'infection et les diriger vers des soins. Et d'ajouter les chercheurs :

« Même si le dépistage rapide du VHC dans les programmes de seringues et d'aiguilles ne va peut-être pas renverser le cours de l'épidémie de VHC, [il fournit] un lien critique vers les services de santé à une population très marginalisée qui, sinon, n'aurait pas recours au système de santé. »

D'autres études ont également trouvé que le dépistage rapide du VHC serait accueilli avec enthousiasme par les populations courant un risque élevé à l'égard du VHC. Lors d'une étude menée à New York auprès de 129 jeunes

adultes qui s'injectaient des drogues, on a constaté que la majorité (83 %) choisissait le dépistage rapide du VHC.

Une autre étude menée à New Haven, dans l'état du Connecticut, a trouvé que les participants dont l'infection au VHC avait été découverte par un test de dépistage rapide (plutôt qu'un test de dépistage standard) étaient considérablement plus susceptibles d'être dirigés vers un service de soins dans le mois suivant l'obtention de leur résultat positif.

### **Point à retenir**

Il importe de se rappeler que la présence d'anticorps anti-VHC ne permet pas de distinguer entre une exposition antérieure au virus et une infection au VHC active courante. Les personnes dont le test de dépistage se révèle positif pour la présence d'anticorps doivent passer un test de la charge virale en VHC afin que les médecins et infirmières puissent déterminer si une infection active est présente.

—Sean R. Hosein

### **RÉFÉRENCES :**

1. Barocas JA, Linas BP, Kim AY, et al. Acceptability of rapid point-of-care hepatitis C tests among people who inject drugs and utilize syringe-exchange programs. *Open Forum Infectious Disease* s. 2016 Apr 6;3(2):ofw075.
2. Ward JW. Testing for HCV: the first step in preventing disease transmission and improving health outcomes for HCV-infected individuals. *Antiviral Therapy* . 2012;17(7 Pt B):1397-401.
3. Morano JP, Zelenev A, Lombard A, et al. Strategies for hepatitis C testing and linkage to care for vulnerable populations: point-of-care and standard HCV testing in a mobile medical clinic. *Journal of Community Health* . 2014 Oct;39(5):922-34.
4. Hayes B, Briceno A, Asher A, et al. Preference, acceptability and implications of the rapid hepatitis C screening test among high-risk young people who inject drugs. *BMC Public Health* . 2014 Jun 25;14:645.

## Produit par:



La source canadienne  
de renseignements sur  
le VIH et l'hépatite C

555, rue Richmond Ouest, Bureau 505, boîte 1104  
Toronto (Ontario) M5V 3B1 Canada  
téléphone : 416.203.7122  
sans frais : 1.800.263.1638  
télécopieur : 416.203.8284  
site Web : [www.catie.ca](http://www.catie.ca)  
numéro d'organisme de bienfaisance : 13225 8740 RR

## Déni de responsabilité

Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à l'hépatite C et des traitements en question.

CATIE fournit des ressources d'information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l'hépatite C qui, en collaboration avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou diffusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l'accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux. Nous ne recommandons ni n'appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé qualifié(e) avant de prendre toute décision d'ordre médical ou d'utiliser un traitement, quel qu'il soit.

CATIE s'efforce d'offrir l'information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant, l'information change et nous encourageons les utilisateurs à s'assurer qu'ils ont l'information la plus récente. Toute personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n'assument aucune responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l'usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent document ou dans tout document publié ou diffusé par CATIE ou auquel CATIE permet l'accès ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.

L'information sur l'usage plus sécuritaire de drogues est offerte comme service de santé publique pour aider les personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l'hépatite virale et de toute autre infection. Cette information n'a pas pour but d'encourager ni de promouvoir l'utilisation ou la possession de drogues illégales.

## La permission de reproduire

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des fins non commerciales sans permission, mais toute modification de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit apparaître sur toute réimpression de ce document : *Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau canadien d'info-traitements sida). Pour plus d'information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au 1.800.263.1638 ou par courriel à [info@catie.ca](mailto:info@catie.ca).*

© CATIE

La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada.

Disponible en ligne à

<http://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2016-06-16/sondage-revele-taux-eleve-acceptation-depistage-rapide-hepatite-c>