



Clair et simple

AFFAIRES DE SANTÉ



Septra (Co-trimoxazole)

(autres appellations : Bactrim, triméthoprimé-sulfaméthoxazole, TMP/SMX)

Qu'est-ce que Septra?

Septra (Co-trimoxazole) est une association de deux antibiotiques (la triméthoprimé et le sulfaméthoxazole) utilisée pour combattre un large éventail d'infections bactériennes.

Pourquoi le Septra dans le cadre de ma médication?

Chez les personnes qui vivent avec le VIH/sida, on utilise Septra le plus souvent pour prévenir ou traiter des pneumonies parfois mortelles, telles que la pneumonie à *Pneumocystis* (PPC) et d'autres pneumonies bactériennes. On l'utilise aussi en prévention d'autres infections, telles que la toxoplasmose, une infection du cerveau qui peut s'avérer mortelle.

Septra est un médicament de la classe des sulfamides. Les personnes qui sont allergiques aux sulfamides ne devraient en aucun cas utiliser Septra.

Comment prendre ce médicament?

Septra est disponible en comprimés à simple ou double concentration, ainsi que sous forme liquide. Le comprimé à double concentration contient deux fois la quantité du médicament contenue dans un comprimé à concentration simple. La concentration dont vous avez besoin dépend de votre affection.

- Pour les personnes qui prennent Septra en prévention d'une PPC, la dose habituelle est d'un comprimé à double concentration une fois par jour à longue échéance. Dans certains cas, on prescrit un comprimé à concentration simple une fois par jour ou un comprimé à concentration double trois fois par semaine, en traitement de longue durée.
- La dose habituelle de Septra pour traiter une PPC est de deux comprimés à double concentration à raison de quatre fois par jour pendant environ trois semaines.
- Lorsqu'on utilise Septra pour traiter d'autres infections bactériennes courantes, la dose habituelle est d'un comprimé à double concentration deux fois par jour pendant une ou deux semaines.

Septra peut se prendre avec ou sans nourriture. Vous devriez boire un grand verre d'eau avec chaque dose de Septra. Si Septra vous dérange l'estomac, essayez de le prendre en mangeant.

Conservez Septra à la température ambiante et absolument hors de la portée des enfants. Ne le gardez pas dans la salle de bains ni dans le réfrigérateur.

Que dois-je faire si j'oublie une dose?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez. Toutefois, si vous vous en rendez compte

Canadian AIDS Treatment
Information Exchange



Réseau canadien
d'info-traitements sida

www.catie.ca

Septra (Co-trimoxazole)

2

moins de deux heures avant la prise de votre prochaine dose, attendez pour reprendre votre horaire habituel. Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets secondaires de Septra?

Les effets secondaires les plus courants de Septra sont : fièvre, éruptions cutanées et démangeaisons. Ces symptômes ne se développent parfois pas avant dix jours après la prise de la première dose.

Parmi les effets secondaires moins fréquents de Septra, mentionnons les suivants : douleurs abdominales accompagnées de nausées et de diarrhée, maux de tête et douleurs articulaires.

Si vous éprouvez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou pharmacien et demandez-lui conseil. Il existe des médicaments pour traiter ces effets secondaires, qui vous permettront de poursuivre votre traitement avec Septra.

Les personnes qui souffrent d'effets secondaires graves peuvent être soumises à une procédure appelée « désensibilisation », qui permet parfois à l'organisme de répondre plus favorablement à Septra.

Si vous ne tolérez pas du tout Septra, demandez à votre médecin ou pharmacien de vous recommander un autre médicament en prévention ou en traitement de votre PPC.

Dans certains cas, Septra peut faire baisser la numération des globules blancs (globules nécessaires pour lutter contre les infections), des globules rouges (globules essentiels au transport de l'oxygène dans votre organisme) et des plaquettes (qui favorisent la coagulation du sang). Septra peut aussi causer des troubles du foie et des reins. Par conséquent, il est important de subir régulièrement des analyses de sang, dans l'éventualité où ces numérations changeraient.

Quelles autres précautions devrais-je prendre lorsque je suis un traitement avec Septra?

En raison du risque de graves réactions allergiques attribuables à Septra, les personnes qui sont allergiques aux sulfamides ne doivent prendre Septra sous aucun prétexte.

Les femmes enceintes s'adresseront à leur médecin avant de prendre Septra, afin qu'il puisse leur expliquer les risques éventuels auxquels elles exposent leur fœtus.

Septra peut accroître la sensibilité au soleil et aux lampes solaires. Par conséquent, portez des vêtements de protection et utilisez une lotion solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) d'au moins 15 chaque fois que vous comptez rester au soleil pendant de longues périodes. Évitez les cabines de bronzage.

Assurez-vous d'avoir mentionné à votre médecin et à votre pharmacien tous les médicaments disponibles sur et sans ordonnance (y compris les vitamines et remèdes à base d'herbes médicinales) que vous prenez. Avant de commencer un nouveau traitement (prescrit ou pas), parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

Les personnes sous traitement de longue durée avec Septra doivent savoir que ce médicament peut diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux et augmenter le risque de métrorragies (hémorragies utérines se produisant en dehors des règles).



Des décisions au sujet des traitements médicaux particuliers devraient toujours être prises en consultation avec un médecin praticien qualifié bien informé au sujet de la maladie HIV-CONNEXE et des traitements en question.



L'échange de l'information canadien de traitement de SIDA (CATIE) fournit en bonne foi des ressources de l'information aux personnes d'aide vivant en HIV/SIDA qui souhaitent contrôler leur propre santé dans l'association avec leurs fournisseurs de soin. L'information a accédé à travers ou a édité ou a fourni par CATIE, cependant, n'est pas être considéré conseil médical. Nous ne recommandons pas ou préconiser des traitements particuliers et nous invitons les utilisateurs à consulter en tant que large gamme des sources comme possible. Nous invitons fortement des lecteurs à consulter un médecin praticien qualifié avant d'entreprendre n'importe quelle décision, utilisation ou action à caractère médical.

Nous ne garantissons pas l'exactitude ou la perfection d'aucune information consultés à travers ou édités ou fournis par CATIE. Les personnes comptant sur cette information font tellement entièrement à leur propre risque. Ni CATIE ni l'agence de santé publique du Canada ni aucune de leurs employés, directeurs, officiers ou volontaires ne peuvent être jugés responsable des dommages de n'importe quelle sorte qui peuvent résulter de l'utilisation ou l'abus d'une telle information. Les vues ont exprimé ci-dessus ou en n'importe quel article ou publication a accédé ou a édité ou a fourni par CATIE sont seulement ceux des auteurs et ne reflètent pas les politiques ou les avis de CATIE ou les vues de l'agence de santé publique du Canada.

La fiche documentaire de Copyright:This est rendue disponible par une collaboration entre les services asiatiques de SIDA de la Communauté (ACAS) et l'échange de l'information canadien de traitement de SIDA (CATIE).

Contenu original développé par ACAS, 2001. Cette information est également disponible en français, chinois, tagalog, Vietnamien, Swahili, et d'autres langues au placement de languages.catie.ca et de www.acas.org

A été fournies par l'agence de santé publique du Canada.