



Services de dépistage du VIH, des hépatites C et B ainsi que de la tuberculose

POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES afin d'améliorer la connaissance, chez les clients, de leur statut d'infection à VIH, à l'hépatite C (VHC), à l'hépatite B (VHB) et à la tuberculose, et de prévenir la transmission ultérieure de ces maladies infectieuses en facilitant l'accès au dépistage et à du soutien :

- Éduquer les clients à propos des bienfaits d'un dépistage périodique, d'un diagnostic précoce et de traitements pour le VIH, le VHC, le VHB et la tuberculose
- Éduquer les clients à propos des types de dépistage offerts pour favoriser un choix éclairé
- Référer les clients à des fournisseurs de services de dépistage et de counselling dans la communauté
- Établir et maintenir des relations avec une variété de fournisseurs de services de dépistage et de counselling, en particulier ceux qui ont de l'expérience de travail auprès de personnes qui consomment des drogues
- Mettre en œuvre des services de counselling pré- et post-test ainsi que de dépistage volontaire du VIH, du VHC, du VHB et de la tuberculose, en conformité avec la réglementation et les lignes directrices municipales, provinciales et fédérales
- Évaluer et publier toute intervention de dépistage réalisée.

Messages clés

Des facteurs sociaux et sexuels et des comportements en lien avec la consommation de drogues (p. ex., le partage de matériel) se combinent pour accroître le risque d'infection et de transmission de pathogènes, chez les personnes qui consomment des drogues. Les pathogènes particulièrement préoccupants sont le VIH, le VHC, le VHB, la syphilis, la chlamydia et la gonorrhée. (Pour des conseils sur le dépistage d'infections transmissibles sexuellement, prière de consulter les Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement, publiées par l'Agence de la santé publique du Canada, à <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/index->

fra.php.) Des soins médicaux inconsistants ainsi que des hésitations concernant le dévoilement de la consommation de drogues peuvent accroître le risque d'infection. Puisque les programmes de seringues et d'aiguilles (PSA) sont souvent les seules sources de soins préventifs pour les personnes qui consomment des drogues, ces programmes sont des endroits importants pour offrir des services de dépistage et de counselling. Cependant, il existe un certain nombre d'obstacles au recours aux services, notamment des facteurs individuels (p. ex., peur du dépistage, peur d'être stigmatisé après un dépistage positif), des facteurs liés aux fournisseurs de services (p. ex., réticence à évaluer la nécessité d'un dépistage, peu de lien entre le fournisseur de services et le client) ainsi que des facteurs de niveau organisationnel/institutionnel (p. ex., ressources financières limitées pour fournir des services complets en matière de dépistage, manque de services de dépistage anonyme).

Les taux de dépistage et de résultats annoncés peuvent être augmentés notamment en combinant d'autres tests et services médicaux, en offrant le dépistage rapide, en étant présents au bon endroit, en offrant des incitations financières et le dépistage anonyme. Les services de dépistage et de counselling peuvent également influencer les connaissances et les pratiques des clients pour prévenir la transmission de pathogènes.