



POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI facilitent l'utilisation de matériel pour l'inhalation

plus sécuritaire de
méthamphétamine cristallisée



DISTRIBUTION DE MATÉRIEL

- Pipes à récipient et embouts
- Matériel pour des relations sexuelles plus sécuritaires, comme des condoms et du lubrifiant
- Offrir des embouts avec chaque pipe à récipient fournie
- Ne pas exiger l'échange de matériel utilisé
- Selon les quantités demandées par le client, sans nombre maximal

ÉDUCATION

- Risques liés au partage du matériel pour fumer et aux relations sexuelles non protégées
- Utilisation plus sécuritaire du matériel
- Pratiques pour fumer de façon plus sécuritaire
- Élimination correcte du matériel usagé d'inhalation plus sécuritaire
- Pratiques sexuelles plus sécuritaires
- Pratiques de prévention des surdoses de stimulants
- Quand remplacer une pipe à récipient :
 - La pipe à récipient et/ou l'embout ont été utilisés par une autre personne
 - La pipe à récipient est égratignée, émaillée ou craquée
 - L'embout est brûlé

ÉLIMINATION

- Inciter les clients à rapporter les pipes usagées ou endommagées, ou à en disposer correctement
- Jeter le matériel d'inhalation usagé conformément aux règles locales pour les déchets biomédicaux
- Offrir diverses tailles de contenants à déchets biomédicaux pour l'élimination sécuritaire
- Offrir de multiples sites pratiques pour l'élimination sécuritaire, en milieu rural, éloigné et urbain

RISQUES

- Si plus d'une personne utilise le même matériel pour fumer et si celui-ci est contaminé par le VIH, le VHC, le VHB et/ou des bactéries causant la pneumonie, etc., il peut y avoir transmission
- Risque accru de transmission du VIH en raison de comportements sexuels liés à la consommation de drogues
- Une consommation prolongée peut également conduire à l'irritabilité et à une psychose, appelée « tweaking »
- La consommation de cette drogue et une hygiène buccale lacunaire peuvent entraîner la carie dentaire
- Fumer de la méthamphétamine cristallisée peut aggraver des affections existantes comme la maladie pulmonaire obstructive chronique et l'asthme
- L'utilisation de pipes de fabrication artisanale (p. ex., à partir d'ampoules électriques, de cannettes de boissons gazeuses ou de tubes pour l'inhalation de crack) peut causer des coupures et des brûlures

COMPORTEMENTS

- Le partage de pipes à récipient est courant
- Les normes de certains groupes peuvent favoriser le partage des pipes plutôt que leur utilisation individuelle
- L'utilisation de méthamphétamine cristallisée est courante chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui s'adonnent au « chemsex » ou « Party and Play » (PnP)