



POLITIQUES RECOMMANDÉES POUR DES PRATIQUES EXEMPLAIRES QUI **facilitent l'inhalation plus sécuritaire du crack-cocaïne avec une pipe** (tube, embout et grille)



DISTRIBUTION DE MATÉRIEL

- Tubes, embouts, grilles et bâtons poussoirs
- Offrir des embouts avec chaque tube/pipe
- Pratiques sexuelles plus sécuritaires – condoms, lubrifiant, etc.
- Ne pas exiger l'échange de matériel utilisé
- Selon les quantités demandées par le client, sans nombre maximal

ÉDUCATION

- Utilisation plus sécuritaire du matériel
- Pratiques pour fumer de façon plus sécuritaire
- Risques liés au partage de tubes et à l'utilisation de pipes de fabrication artisanale
- Pratiques sexuelles plus sécuritaires
- Pratiques de prévention des surdoses
- Quand remplacer un tube :
 - Après utilisation par une autre personne
 - S'il est ébréché, égratigné ou fissuré
 - Si l'embout est brûlé ou si la grille est desserrée

ÉLIMINATION

- Encourager les clients à retourner et/ou à jeter correctement les tubes usagés ou brisés
- Jeter le matériel d'inhalation usagé conformément aux règles locales pour les déchets biomédicaux
- Offrir diverses tailles de contenants à déchets biomédicaux pour l'élimination sécuritaire
- Offrir de multiples sites pratiques pour l'élimination sécuritaire, en milieu rural et urbain

RISQUES

- Risques accrus de lésions et de brûlures à la bouche et aux lèvres avec des pipes de fabrication artisanale (p. ex., tubes métalliques, canettes de boissons gazeuses, antennes, bouteilles de plastique, inhalateurs, compte-gouttes, ampoules électriques, souffler un récipient au bout d'un tube à crack)
- Les bouteilles de plastique peuvent produire des vapeurs toxiques lorsque chauffées
- Le verre de piètre qualité peut éclater/exploser lorsque chauffé
- Brûlures aux lèvres et à la bouche avec le matériel chauffé
- Une grille mal ajustée peut être inhalée et endommager la cavité buccale, la gorge et les poumons
- Risque de transmission si du matériel contaminé par le VHB, le VHC ou des bactéries causant la pneumonie, etc., est utilisé par plus d'une personne
- Le fentanyl et ses analogues sont de plus en plus souvent détectés dans les drogues illicites, y compris le crack, ce qui augmente le taux de surdoses

COMPORTEMENTS

- Fumer fréquemment et sur une longue période peut causer de l'inflammation, des coupures, des brûlures et des lésions buccales. Les lésions et l'inflammation buccales peuvent augmenter le risque d'infection par le VIH
- Le partage de pipes est répandu
- La mise en commun d'argent pour acheter des drogues est associée au partage de matériel pour fumer
- Les personnes qui ne fument pas souvent sont moins susceptibles de posséder leur propre matériel