

C5. RAISONS D'UNE RELATION SEXUELLE NON PROTÉGÉE

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT :

Résultats :

- ✓ Comportement lié à la santé : améliorer les pratiques de prévention chez les personnes vivant avec le VIH.

Types d'intervention :

- ✓ Séances d'acquisition des compétences pour augmenter la capacité à adopter des comportements réduisant les risques
- ✓ Activités de sensibilisation destinées aux populations prioritaires en vue d'augmenter leur capacité à adopter des comportements réduisant les risques.

A bien fonctionné avec ces populations :

- ✓ HARSAH
- ✓ Personnes ayant reçu un diagnostic de VIH

Interventions contre :

- ✓ VIH

DESCRIPTION

Description : Ce court questionnaire évalue les raisons d'une relation sexuelle non protégée après un diagnostic de VIH; il peut être considéré comme le revers des comportements de protection mesurés dans d'autres outils.

POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?

- ✓ Cet outil peut servir à déterminer des comportements à risque ou des situations à l'origine de tels comportements et servir de complément aux mesures sur les comportements de protection face à la transmission.
- ✓ Il convient à l'évaluation des effets d'un programme avant et après sa mise en place.
- ✓ Court et facile à remplir.
- ✓ Il peut facilement être programmé pour être utilisé par voie électronique.

Élaboré en :

- ✓ Anglais

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L'ANALYSE

ADMINISTRATION

- Il faudra moins de 5 minutes chaque fois pour remplir ce questionnaire ou ces questions d'entretien.
- Indiquer aux participants le motif d'utilisation du questionnaire, en précisant qu'il vise à évaluer l'intervention dans le but de l'améliorer, et non eux personnellement.
- La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de remplir le questionnaire et leur assurer qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de le faire. On peut offrir à ceux qui refusent de remplir le questionnaire l'option d'effectuer d'autres tâches au moment du remplissage afin de protéger la confidentialité de leur décision . (Pour de plus amples renseignements sur les considérations d'ordre éthique dans le cadre des évaluations, se reporter aux [Ressources en matière d'éthique.](#))
- S'il est utilisé au sein d'un groupe, s'assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l'espace est confidentiel. Personne ne doit pouvoir voir leurs réponses (leur écran ou leurs feuilles) et il faut mettre les questionnaires remplis dans une enveloppe scellée.

OPTIONS DE CONCEPTION

Mesure avant et après une intervention : (Il s'agit de l'option recommandée pour cet outil puisqu'elle permet de mesurer un changement réel.) Mesurer uniquement à la fin de l'intervention n'est pas recommandé, car la mémoire des gens n'est pas fiable pour ce type de comportement durant une longue période).

1. **QUAND L'UTILISER :** Remplir les questionnaires avant l'intervention ou tout au début de cette dernière, et encore une fois après l'intervention ou le plus près possible de la fin (la dernière séance ne convient souvent pas puisqu'elle peut être une célébration ou comporter une faible participation).
2. **LIENS ENTRE LES RÉSULTATS :** Inclure une façon d'associer les questionnaires avant et après d'une même personne tout en protégeant la confidentialité, par exemple en utilisant un [mot de passe](#) ou un identificateur créé par les répondants.
3. **POINTAGE :** Additionner le nombre total de personnes ayant coché chaque raison.
4. **ANALYSE :** Comparer les totaux avant et après l'intervention pour chaque raison, en regardant les améliorations, ce qui signifie que moins de raisons ont été cochées. Noter également le nombre de réponses identiques et le nombre de raisons supplémentaires cochées.

C5. Raisons d'une relation sexuelle non protégée

Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu une relation sexuelle sans condom?	<input type="checkbox"/> Oui (répondre aux questions suivantes) <input type="checkbox"/> Non (fin)
Pour quelles raisons avez-vous eu une relation sexuelle sans condom? (Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.)	<input type="checkbox"/> Je n'avais pas de condom à portée de main <input type="checkbox"/> J'avais un condom, mais je ne voulais pas l'utiliser. <input type="checkbox"/> J'avais un condom, mais mon partenaire ne voulait pas l'utiliser. <input type="checkbox"/> Il me gênait <input type="checkbox"/> Cela a perturbé notre plaisir <input type="checkbox"/> Je voulais tout partager avec mon partenaire <input type="checkbox"/> Le contact anal n'est pas un comportement à risque <input type="checkbox"/> Le contact oral n'est pas un comportement à risque <input type="checkbox"/> Ma charge virale est faible <input type="checkbox"/> Je prends des médicaments <input type="checkbox"/> J'ai reçu de l'argent pour avoir une relation sexuelle <input type="checkbox"/> J'ai donné de l'argent pour avoir une relation sexuelle

Source : Adapté de : Camoni, L., Conte, I., Regine, V., Colucci, A., Chiriotto, M., Vullo, V.,... Suligo, B. (2011). **Sexual behaviour reported by a sample of Italian MSM before and after HIV diagnosis**. *Annali Dell'Istituto Superiore Di Sanita*, 47(2), 214-219.; and the **Checking in Survey**, <http://prismhealth.us/research/past/checking-in/> (a study of *HIV behavioral risks* effectué par Emory University).