

SC2. QUESTIONNAIRE DE FORMATION SUR LE VIH/SIDA AVANT ET APRÈS LE PROGRAMME POUR LES PAIRS BÉNÉVOLES CANADIENS AFRICAINS ET CARIBÉENS

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT :

Résultats :

- ✓ Sensibilisation et connaissance

Types d'intervention :

- ✓ Activités d'éducation ciblées pour une population prioritaire
- ✓ Activités de sensibilisation ciblées pour une population prioritaire
- ✓ Séances d'acquisition des compétences pour augmenter la capacité à adopter des comportements réduisant les risques
- ✓ Activités de sensibilisation et d'éducation destinées aux populations prioritaires

A bien fonctionné avec ces populations :

- ✓ Populations ethnoculturelles (Canadiens africains et caribéens)

Interventions contre :

- ✓ VIH

DESCRIPTION DE L'OUTIL

Description :

- ✓ Un questionnaire de 22 questions qui mesure les connaissances sur la transmission du VIH. Il a été élaboré pour évaluer l'efficacité de la formation des pairs bénévoles recrutés dans les communautés africaines et caribéennes d'Ottawa, en particulier des coiffeurs et des barbiers.

POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?

- ✓ Il est utilisé dans une évaluation du programme de prévention du VIH pour les communautés africaines et caribéennes du Canada.
- ✓ Il convient à l'évaluation des effets d'un programme avant et après sa mise en place.
- ✓ Il est facile à réaliser et à analyser.
- ✓ Il peut facilement être programmé pour être utilisé par voie électronique.

Élaboré en :

- ✓ Anglais

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L'ANALYSE

ADMINISTRATION

- Il faudra environ 15 minutes chaque fois pour remplir ce questionnaire.
- Indiquer aux participants le motif d'utilisation du questionnaire, en précisant qu'il vise à évaluer l'intervention dans le but de l'améliorer et non de les évaluer ou de les juger eux personnellement.
- La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de remplir le questionnaire. Assurer aux participants qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de le faire. Leur offrir l'option de faire au même moment quelque chose qui ressemble à remplir le questionnaire afin de protéger la confidentialité de cette décision. (Pour de plus amples renseignements sur les considérations d'ordre éthique dans le cadre des évaluations, se reporter aux [Ressources en matière d'éthique](#).)
- S'il est utilisé au sein d'un groupe, s'assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l'espace est confidentiel. Personne ne doit pouvoir voir leurs réponses (leur écran ou leurs feuilles) et il faut mettre les questionnaires remplis dans une enveloppe scellée.

OPTIONS DE CONCEPTION

Mesure avant et après une intervention : (Il s'agit de la meilleure option puisqu'elle permet de mesurer un changement réel.)

1. **QUAND L'UTILISER :** Remplir les questionnaires avant l'intervention ou tout au début de cette dernière, et encore une fois après l'intervention ou le plus près possible de la fin (la dernière séance ne convient souvent pas puisqu'elle peut être une célébration ou comporter une faible participation).

2. **LIENS ENTRE LES RÉSULTATS :** Inclure une façon de lier les questionnaires avant et après d'une même personne tout en protégeant la confidentialité, par exemple en utilisant un mot de passe créé par les répondants dont ils se souviennent (voir les [Conseils pour créer un mot de passe](#)).

3. **POINTAGE :** Déterminer le pointage total de chaque personne en ce qui concerne les connaissances sur le VIH avant et après le programme en calculant le nombre total de bonnes réponses, en attribuant le pointage 0 à chaque mauvaise réponse et le pointage 1 à chaque bonne réponse. La réponse aux questions 1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20 et 21 est **VRAI** et la réponse aux questions 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18 et 22 est **FAUX**. Compter les réponses « Ne sait pas » comme de mauvaises réponses. Le pointage varie de 0 à 22.

4. **ANALYSE :** Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes ont vu leur pointage s'améliorer, combien ont conservé le même pointage et combien ont vu leur pointage diminuer.

Mesure du changement seulement après la fin d'une intervention : (Il s'agit d'une deuxième option parce que les gens croient souvent que l'intervention a eu plus de répercussions qu'elle en a eues en réalité.)

1. Adapter toutes les questions de façon à demander aux personnes quelle est leur réponse à l'heure actuelle et quelle était leur réponse avant l'intervention.

Par exemple, pour la question 1, demander : « *Maintenant, je pense que VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine.* » ET « *Avant l'atelier, je pensais que VIH signifiait virus de l'immunodéficience humaine.* » (Voir un [exemple](#) de questionnaire avec les versions avant et après.)

2. **POINTAGE :** Déterminer le pointage total de chaque personne en ce qui concerne les connaissances sur le VIH avant et après le programme en calculant le nombre total de bonnes réponses, en attribuant le pointage 0 à chaque mauvaise réponse et le pointage 1 à chaque bonne réponse. La réponse aux questions 1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19 et 21 est **VRAI** et la réponse aux questions 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 20 et 22 est **FAUX**. Compter les réponses « Ne sait pas » comme de mauvaises réponses. Le pointage varie de 0 à 22.

3. **ANALYSE :** Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes disent avoir vu leur pointage s'améliorer, avoir conservé le même pointage et avoir vu leur pointage diminuer.

SC2. Questionnaire de formation sur le VIH/sida avant et après le programme pour les pairs bénévoles

1. VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine.	Vrai	Faux	Ne sait pas
2. Il existe une différence entre VIH et sida.	Vrai	Faux	Ne sait pas
3. Une personne infectée par le VIH est séropositive pour le VIH.	Vrai	Faux	Ne sait pas
4. Il existe un seul mode de transmission du VIH.	Vrai	Faux	Ne sait pas
5. Il est possible d'être infecté par le virus du sida lors d'une relation sexuelle non protégée.	Vrai	Faux	Ne sait pas
6. Il est possible d'être infecté par le virus du sida en embrassant une personne séropositive pour le VIH.	Vrai	Faux	Ne sait pas
7. Seules les personnes qui partagent des aiguilles pour s'injecter de la drogue, les travailleurs et travailleuses du sexe ainsi que les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent être infectés par le VIH.	Vrai	Faux	Ne sait pas
8. Il est possible d'être infecté par le virus du sida par une piqûre de moustique.	Vrai	Faux	Ne sait pas
9. Il est possible d'être infecté par le virus du VIH en réutilisant des objets tranchants (aiguilles, lames de rasoir, etc.) sur lesquels il y a du sang.	Vrai	Faux	Ne sait pas
10. Il est possible d'être infecté par le virus du sida en travaillant avec une personne séropositive pour le VIH ou en la touchant.	Vrai	Faux	Ne sait pas
11. Le virus du sida peut être transmis d'une mère à son enfant au cours de la grossesse, au moment de la naissance et en allaitant.	Vrai	Faux	Ne sait pas
12. L'utilisation de condoms pendant les relations sexuelles permet de se protéger contre les risques d'infection par le virus du sida.	Vrai	Faux	Ne sait pas
13. Les préservatifs féminins n'existent pas.	Vrai	Faux	Ne sait pas
14. Le seul moyen de savoir si vous êtes infecté par le virus du sida est de subir un test de dépistage.	Vrai	Faux	Ne sait pas
15. Le test de dépistage du VIH ne nécessite qu'un échantillon de sang.	Vrai	Faux	Ne sait pas
16. Les personnes infectées par le VIH peuvent être guéries grâce aux traitements actuellement offerts.	Vrai	Faux	Ne sait pas
17. Il est possible de réduire les risques de transmission du VIH entre une mère et son enfant au moment de la naissance à l'aide d'un traitement particulier.	Vrai	Faux	Ne sait pas
18. Une personne séropositive pour le VIH qui suit un traitement ne peut pas transmettre le virus à une autre personne.	Vrai	Faux	Ne sait pas
19. On peut coiffer une personne séropositive pour le VIH sans risque d'infection.	Vrai	Faux	Ne sait pas
20. On peut stériliser un objet sur lequel il y a du sang (par exemple des ciseaux) en le lavant avec du savon et de l'eau chaude.	Vrai	Faux	Ne sait pas
21. Une personne infectée par le virus du sida qui suit un traitement peut travailler et vivre normalement.	Vrai	Faux	Ne sait pas
22. Les personnes infectées par le VIH ou le sida devraient vivre en marge de la société.	Vrai	Faux	Ne sait pas

Source : **Opération SprayNet : Étude de cas de Connectons nos programmes du CATIE**

<http://www.catie.ca/fr/cnp/programme/operation-spraynet> et Santé publique Ottawa (créateur)

[Type text]